

## 'MARC'

### 1. Características vegetativas

Variedad muy vigorosa, porte abierto y una media de 2 brotes laterales por brote central.

Aproximadamente el 85% y el 41,5% de los brotes centrales y laterales, respectivamente, son fructíferos. Variedad bastante productiva.

Hojas bastante grandes, con dientes espaciados. Forma del ápice intermedia y sección transversal ondulada.

### 2. Floración

Plena floración en la primera semana de noviembre (4 días antes que 'Algerie').

Panícula cónica de floración abundante (media de 220 flores/panícula), de color blanco y un cuajado del 4,37 %.

### 3. Características del fruto

Plena maduración en la primera semana de mayo (3 días después que 'Algerie').

Fruto ovalado alargado, sección transversal ligeramente angular, zona peduncular aguda, cavidad del cáliz abierta y ápice plano. Tanto la piel como la pulpa son de color amarillo anaranjado.

Peso medio de 90,10 g, calibre medio de 51,56 mm y espesor de la pulpa de 12,11 mm. Pelado fácil y de sabor aceptable. Ligera tendencia al rajado.

Sólidos solubles: 11,20 °Brix.

Acidez: 7,81 g/l ác. málico.

Firmeza: 1,00 Kg/cm<sup>2</sup>.

Semillas de forma elíptica, peso medio de 3,49 g y una media de 3 semillas por fruto.

