

## 'TEMPRANO DE TORRES TORRES'

### 1. *Características vegetativas*

Variedad de vigor medio, porte semi abierto y una media de 2 brotes laterales por brote central.

Aproximadamente el 85,5% y el 46,5% de los brotes centrales y laterales, respectivamente, son fructíferos. Variedad poco productiva.

Hojas más pequeñas de lo normal, con dientes densos. Forma del ápice intermedia y sección transversal curva.

### 2. *Floración*

Plena floración en la primera semana de noviembre (5 días antes que 'Algerie').

Panícula cónica de floración medianamente abundante (media de 136 flores/panícula), de color blanco amarillento y un cuajado del 6,81 %.

### 3. *Características del fruto*

Plena maduración en la cuarta semana de abril (8 días antes que 'Algerie').

Fruto ovalado, sección transversal angular, zona peduncular aguda, cavidad del cáliz ligeramente abierta y ápice cóncavo. Color de la piel y de la pulpa amarillo anaranjado.

Peso medio de 43,16 g, calibre medio de 39,01 mm y espesor de la pulpa de 6,08 mm. Pelado un poco difícil y de buen sabor.

Sólidos solubles: 11,35 °Brix.

Acidez: 11,19 g/l ác. málico.

Firmeza: 1,33 Kg/cm<sup>2</sup>.

Semillas de forma elíptica, peso medio de 2,49 g y una media de 3-4 semillas por fruto.

