

## 'CABELO'

### 1. Características vegetativas

Variedad muy vigorosa, porte caedizo y entre 1 y 2 brotes laterales por brote central.

Aproximadamente el 35% de los brotes centrales son fructíferos y un 1% de los laterales también lo son. Variedad poco productiva.

Hojas de tamaño muy grande, con dientes poco espaciados. Forma del ápice intermedia y sección transversal curva y ondulada.

### 2. Floración

Plena floración en la segunda semana de noviembre (6 días después que 'Algerie').

Panícula intermedia de floración poco abundante (media de 146 flores/panícula), de color blanco y un cuajado del 8,10%.

### 3. Características del fruto

Plena maduración en la segunda semana de mayo (11 días después que 'Algerie').

Fruto ovalado, sección transversal ligeramente angular, zona peduncular aguda, cavidad del cáliz ligeramente abierta y ápice plano. La piel es de color amarilla y la pulpa anaranjada.

Peso medio de 81,00 g, calibre medio de 48,70 mm y espesor de la pulpa de 11,81 mm. Pelado fácil y buen sabor. Muy poco sensible a la mancha púrpura y rajado y nula incidencia de moteado.

Sólidos solubles: 10,90 °Brix.

Acidez: 12,47 g/l ác. málico.

Firmeza: 0,78 kg/cm<sup>2</sup>.

Semillas de forma elíptica, peso medio de 5,00 g y una media de 3 semillas por fruto.

