

'SISCAR'

1. Características vegetativas

Variedad de vigor medio, porte abierto y con una mayoría de 2 brotes laterales por brote central.

El 100% de los brotes centrales son fructíferos y un 60% de los brotes laterales también lo son. Variedad muy productiva.

Hojas de tamaño grande, con dientes medianamente espaciados. Forma del ápice aguda y sección transversal curva y ondulada.

2. Floración

Plena floración en la primera semana de noviembre (1 día antes que 'Algerie').

Panícula intermedia de floración muy abundante (media de 283,5 flores/panícula), de color blanco y un cuajado del 2,50%.

3. Características del fruto

Plena maduración en la primera semana de mayo (1 día antes que 'Algerie').

Fruto redondeado alargado, sección transversal ligeramente angular, zona peduncular obtusa, cavidad del cáliz ligeramente abierta y ápice cóncavo. Tanto la piel como la pulpa son de color anaranjado.

Peso medio de 71,90 g, calibre medio de 47,57 mm y espesor de la pulpa de 11,29 mm. Pelado no muy fácil y sabor medio. Muy poco sensible a la mancha púrpura, tendencia media al rajado y nula incidencia de moteado.

Sólidos solubles: 9,60 °Brix.

Acidez: 11,27 g/l ác. málico.

Firmeza: 0,82 kg/cm².

Semillas de forma redonda y ovalada, peso medio de 2,23 g y una media de 4 semillas por fruto.

