

## 'POÇO BARRETO'

### 1. Características vegetativas

Variedad de vigor medio, porte semi abierto y con una mayoría de 4 brotes laterales por brote central.

El 100% de los brotes centrales son fructíferos y un 50% de los brotes laterales también lo son. Variedad medianamente productiva.

Hojas de tamaño medio, con dientes medianamente espaciados. Forma del ápice intermedia y sección transversal curva y ondulada.

### 2. Floración

Plena floración en la tercera semana de noviembre (11 días antes que 'Algerie').

Panícula cónica de floración abundante (media de 216 flores/panícula), de color blanco y un cuajado del 5,80%.

### 3. Características del fruto

Plena maduración en la primera semana de mayo (3 días después que 'Algerie').

Fruto redondeado alargado, sección transversal redondeada, zona peduncular redondeada, cavidad del cáliz ligeramente abierta y ápice plano. Piel de color anaranjado y pulpa de color blanca.

Peso medio de 50,12 g, calibre medio de 40,44 mm y espesor de la pulpa de 10,07 mm. Pelado fácil y sabor medio. Nula incidencia de mancha púrpura y moteado y ligera tendencia al rajado.

Sólidos solubles: 11,50 °Brix.

Acidez: 12,95 g/l ác. málico.

Firmeza: 0,77 kg/cm<sup>2</sup>.

Semillas de forma elíptica, peso medio de 2,38 g y una media de 2 semillas por fruto. Tegumento jaspeado.

