

'ROLHAO - II'

1. Características vegetativas

Variedad vigorosa, porte abierto y con una mayoría de 3 brotes laterales por brote central.

El 100% de los brotes centrales son fructíferos y un 90% de los brotes laterales también lo son. Variedad muy productiva.

Hojas de tamaño grande, con dientes espaciados. Forma del ápice aguda y sección transversal plana y curva.

2. Floración

Plena floración en la segunda semana de noviembre (3 días después que 'Algerie').

Panícula cónica de floración abundante (media de 201 flores/panícula), de color blanco y un cuajado del 6,17%.

3. Características del fruto

Plena maduración en la primera semana de mayo (3 días después que 'Algerie').

Fruto ovalado, sección transversal ligeramente angular, zona peduncular obtusa, cavidad del cáliz abierta y ápice cóncavo. Tanto la piel como la pulpa son de color anaranjado.

Peso medio de 69,30 g, calibre medio de 46,06 mm y espesor de la pulpa de 11,25 mm. pelado fácil y buen sabor. Nula incidencia de mancha púrpura y moteado y muy ligera tendencia al rajado.

Sólidos solubles: 9,32 °Brix.

Acidez: 10,30 g/l ác. málico

Firmeza: 1,03 Kg/cm²

Semillas de forma elíptica, peso medio de 2.61 g y entre 3 y 4 semillas por fruto. Tegumento jaspeado.

