

'CREMAOR'

1. Características vegetativas

Variedad de vigor medio, porte abierto y con una media de 3 brotes laterales por brote central.

El 100% de los brotes centrales son fructíferos y un 95% de los brotes laterales también lo son. Variedad medianamente productiva.

Hojas de tamaño medio, con dientes espaciados. Forma del ápice agudo y sección transversal curva.

2. Floración

Plena floración en la primera semana de noviembre (5 días antes que 'Algerie').

Panícula cónica de floración abundante (media de 151 flores/panícula), de color blanco y un cuajado del 4,90%.

3. Características del fruto

Plena maduración en la primera semana de mayo (3 días después que 'Algerie').

Fruto ovalado, sección transversal angular, zona peduncular aguda, cavidad del cáliz abierta y ápice cóncavo. Tanto la piel como la pulpa son de color anaranjado.

Peso medio de 79,19 g, calibre medio de 49,79 mm y espesor de la pulpa de 13,45 mm. Pelado fácil y de sabor medio. Ligera sensibilidad a la mancha púrpura y al rajado y nula incidencia de moteado.

Sólidos solubles: 10,25 °Brix.

Acidez: 10,21 g/l ác. málico.

Firmeza: 2,07 kg/cm².

Semillas de forma ovalada, peso medio de 2,70 g y una media de 3 semillas por fruto.

