

‘SAMPER - I’

1. Características vegetativas

Variedad de vigor medio, porte abierto y con una media de 3 brotes laterales por brote central.

El 100% de los brotes centrales son fructíferos y un 80% de los brotes laterales también lo son. Variedad muy productiva.

Hojas de tamaño grande, con dientes espaciados. Forma del ápice agudo y sección transversal curva y ondulada.

2. Floración

Plena floración en la primera semana de noviembre (5 días antes que ‘Algerie’).

Panícula cónica de floración muy abundante (media de 250 flores/panícula), de color blanco y un cuajado del 4,73%.

3. Características del fruto

Plena maduración en la primera semana de mayo (2 días antes que ‘Algerie’).

Fruto ovalado, sección transversal ligeramente angular, zona peduncular aguda, cavidad del cáliz ligeramente abierta y ápice cóncavo. Tanto la piel como la pulpa son de color anaranjado.

Peso medio de 66,48 g, calibre medio de 46,01 mm y espesor de la pulpa de 9,80 mm. Pelado medianamente fácil y de buen sabor. Un poco sensible a la mancha púrpura, ligera tendencia al rajado, y nula incidencia de moteado.

Sólidos solubles: 11,57 °Brix.

Acidez: 9,70 g/l ác. málico.

Firmeza: 0,71 kg/cm².

Semillas de forma elíptica, peso medio de 2,45 g y entre 4 y 5 semillas por fruto.

