

'SAMPER II'

1. Características vegetativas

Variedad de vigor medio, porte abierto y con una media de 2 brotes laterales por brote central.

El 100% de los brotes tanto centrales como laterales son fructíferos. Variedad muy productiva.

Hojas de tamaño medio, con dientes poco espaciados. Forma del ápice intermedio y sección transversal curva.

2. Floración

Plena floración en la tercera semana de octubre (23 días antes que 'Algerie').

Panícula cónica de floración muy abundante (media de 245 flores/panícula), de color blanco y un cuajado del 5,27%.

3. Características del fruto

Plena maduración en la tercera semana de abril (13 días antes que 'Algerie').

Fruto ovalado, sección transversal ligeramente angular, zona peduncular obtusa, cavidad del cáliz abierta y ápice plano. Tanto la piel como la pulpa son de color anaranjado.

Peso medio de 66,58 g, calibre medio de 46,00 mm y espesor de la pulpa de 11,34 mm. Pelado fácil y de buen sabor. Sensibilidad media a la mancha púrpura, ligera tendencia al rajado y nula incidencia de moteado.

Sólidos solubles: 11,42 °Brix.

Acidez: 13,84 g/l ác. málico.

Firmeza: 0,83 kg/cm².

Semillas de forma elíptica, peso medio de 2,61 g y una media de 3 semillas por fruto.

