

'BENIMELI'

1. Características vegetativas

Variedad vigorosa, porte abierto y entre 2 y 3 brotes laterales por brote central.

El 100% de los brotes centrales son fructíferos y un 90% de los brotes laterales también lo son. Variedad productiva.

Hojas de tamaño medio, con dientes poco espaciados. Forma del ápice intermedia y sección transversal plana.

2. Floración

Plena floración en la primera semana de noviembre (6 días antes que 'Algerie').

Panícula intermedia de floración abundante (media de 233 flores/panícula), de color blanco y un cuajado del 5,83%.

3. Características del fruto

Plena maduración en la primera semana de mayo (3 días después que 'Algerie').

Fruto redondeado alargado, sección transversal redondeada, zona peduncular obtusa, cavidad del cáliz ligeramente abierta y ápice cóncavo. Tanto la piel como la pulpa son de color anaranjado.

Peso medio de 74,54 g, calibre medio de 48,00 mm y espesor de la pulpa de 11,88 mm. Pelado fácil y de buen sabor. Ligera sensibilidad a la mancha púrpura y al rajado, y nula incidencia de moteado.

Sólidos solubles: 10,57 °Brix.

Acidez: 3,46 g/l ác. málico.

Firmeza: 1,57 kg/cm².

Semillas de forma elíptica, peso medio de 3,33 g y una media de 3 semillas por fruto.

