

'PUXINBEN'

1. Características vegetativas

Variedad vigorosa, porte abierto y con una media de 3 brotes laterales por brote central.

El 100% de los brotes centrales son fructíferos y un 60% de los brotes laterales también lo son. Variedad poco productiva.

Hojas de tamaño medio, con dientes poco espaciados. Forma del ápice intermedio y sección transversal plana.

2. Floración

Plena floración en la primera semana de noviembre (3 días antes que 'Algerie').

Panícula intermedia de floración abundante (media de 165,5 flores/panícula), de color blanco y un cuajado del 2,68%.

3. Características del fruto

Plena maduración en la segunda semana de mayo (7 días después que 'Algerie').

Fruto ovalado, sección transversal angular, zona peduncular obtusa, cavidad del cáliz ligeramente abierta y ápice plano. Tanto la piel como la pulpa son de color anaranjado.

Peso medio de 62,50 g, calibre medio de 45,58 mm y espesor de la pulpa de 9,78 mm. Pelado fácil y de sabor de medio a bajo. Muy ligera sensibilidad a la mancha púrpura y al rajado y nula incidencia de moteado.

Sólidos solubles: 11,20 °Brix.

Acidez: 6,80 g/l ác. málico.

Firmeza: 1,93 kg/cm².

Semillas de forma ovalada, peso medio de 3,70 g y una media de 3 semillas por fruto.

