

## 'VILA'

### 1. Características vegetativas

Variedad de vigor medio, porte abierto y con una media de 2 brotes laterales por brote central.

El 100% de los brotes tanto centrales como laterales son fructíferos. Variedad de producción media.

Hojas de tamaño grande, con dientes espaciados. Forma del ápice agudo y sección transversal ondulada.

### 2. Floración

Plena floración en la primera semana de octubre (36 días antes que 'Algerie').

Panícula cónica de floración baja (media de 135 flores/panícula), flores de color blanco y un cuajado del 12,2%.

### 3. Características del fruto

Maduración en la primera semana de abril (30 días antes que 'Algerie').

Fruto redondeado, sección transversal ligeramente angular, zona peduncular redondeada, cavidad del cáliz ligeramente abierta y ápice plano. Tanto la piel como la pulpa son de color anaranjado.

Peso medio de 52,32 g, calibre medio de 42,40 mm y espesor de la pulpa de 10,31 mm. Pelado con ligera dificultad y de buen sabor. Ligeramente sensible a la mancha púrpura, ligera tendencia al rajado y nula incidencia de moteado.

Sólidos solubles: 13,27 °Brix.

Acidez: 13,35 g/l ác. málico.

Firmeza: 1,30 kg/cm<sup>2</sup>.

Semillas de forma ovalada, peso medio de 2,92 g y una media de 3-4 semillas por fruto.

