

'MERCEDES'

1. Características vegetativas

Variedad de vigor medio, de porte abierto y 3 brotes laterales por brote central.

El 100% de los brotes centrales y el 65% de los laterales son fructíferos. Variedad de producción media-baja.

Hojas de tamaño medio con densidad de dientes media. Forma del ápice intermedio y sección transversal curvada.

2. Floración

Plena floración en la segunda semana de noviembre (2 días después que 'Algerie').

Panícula cónica de floración baja (media de 152 flores/panícula), flores de color blanco y un cuajado del 9,86%.

3. Características del fruto

Maduración en la primera semana de mayo (2 días después que 'Algerie').

Fruto ovalado alargado, sección transversal angular, zona peduncular aguda, cavidad del cáliz ligeramente abierta y ápice plano. La piel es de color anaranjado y la pulpa es naranja.

Peso medio de 49,52 g, calibre medio de 41,95 mm y espesor de la pulpa de 8,05 mm. Pelado fácil y de sabor aceptable. Medianamente sensible a la mancha púrpura, ligera tendencia al rajado y mediana sensibilidad al moteado en condiciones favorables.

Sólidos solubles: 11,40 °Brix.

Acidez: 7,52 g/l ác. málico.

Firmeza: 1,90 kg/cm².

Semillas de forma elíptica, peso medio de 2,36 g y una media de 3-5 semillas por fruto.

