

'SACÓS' (CHONERA)

1. Características vegetativas

Variedad vigorosa, de porte abierto y 1 brote lateral por brote central.

El 100% de los brotes centrales y el 47% de los laterales son fructíferos. Variedad muy productiva.

Hojas de tamaño grande con dientes espaciados. Forma del ápice agudo y sección transversal ondulada.

2. Floración

Plena floración en la primera semana de noviembre (4 días antes que 'Algerie').

Panícula de forma cónica, de floración media (media de 216 flores/panícula), flores de color blanco y un cuajado del 7,12%.

3. Características del fruto

Maduración en la tercera semana de abril (10 días antes que 'Algerie').

Fruto redondeado alargado, sección transversal ligeramente angular, zona peduncular obtusa, cavidad del cáliz ligeramente abierta y ápice plano. Tanto la piel como la pulpa son de color anaranjado.

Peso medio de 68,32 g, calibre medio de 46,36 mm y espesor de la pulpa de 10,48 mm. Pelado fácil y de muy buen sabor. Nula incidencia de mancha púrpura, nula tendencia al rajado y elevada sensibilidad al moteado en condiciones favorables.

Sólidos solubles: 13,10 °Brix.

Acidez: 13,67 g/l ác. málico.

Firmeza: 1,50 kg/cm².

Semillas de forma elíptica, peso medio de 2,17 g y una media de 4-5 semillas por fruto.

