

## 'IKRAMULLAH-2'

### 1. Características vegetativas

Variedad muy vigorosa, de porte abierto y 3 brotes laterales por brote central.

El 97% de los brotes centrales y el 22% de los laterales son fructíferos. Variedad de producción media.

Hojas de tamaño medio con dientes intermedios. Forma del ápice agudo y sección transversal plana.

### 2. Floración

Plena floración en la segunda semana de noviembre (2 días antes que 'Algerie').

Panícula de forma intermedia, de floración media (media de 175 flores/panícula), flores de color blanco y un cuajado del 4,95%.

### 3. Características del fruto

Maduración en la cuarta semana de abril (5 días antes que 'Algerie').

Fruto ovalado, sección transversal angular, zona peduncular obtusa, cavidad del cáliz ligeramente abierta y ápice cóncavo. La piel es de color amarilla y la pulpa es blanca amarillenta.

Peso medio de 44,96 g, calibre medio de 40,64 mm y espesor de la pulpa de 7,81 mm. Pelado de medio a difícil y de sabor mediocre. Nula incidencia de mancha púrpura, nula tendencia al rajado y ligera sensibilidad al moteado en condiciones favorables.

Sólidos solubles: 12,17 °Brix.

Acidez: 4,90 g/l ác. málico.

Firmeza: 1,60 kg/cm<sup>2</sup>.

Semillas de forma elíptica, peso medio de 1,80 g y una media de 4-5 semillas por fruto.

