

'KHYBER-1'

1. Características vegetativas

Variedad vigorosa, de porte abierto y 3 brotes laterales por brote central.

El 92% de los brotes centrales y el 43% de los laterales son fructíferos. Variedad de producción baja.

Hojas de tamaño medio con dientes de densidad intermedia. Forma del ápice agudo y sección transversal curva.

2. Floración

Plena floración en la primera semana de noviembre (1 día antes que 'Algerie').

Panícula de forma cónica, de floración media (media de 177 flores/panícula), flores de color blanco y un cuajado del 4,88%.

3. Características del fruto

Maduración en la segunda semana de abril (20 días antes que 'Algerie').

Fruto ovalado, sección transversal angular, zona peduncular obtusa, cavidad del cáliz ligeramente abierta y ápice plano. Tanto la piel como la pulpa son de color anaranjado.

Peso medio de 32,04 g, calibre medio de 36,05 mm y espesor de la pulpa de 7,81 mm. Pelado difícil y de sabor aceptable. Bastante sensible a la mancha púrpura, nula tendencia al rajado y sensibilidad media al moteado en condiciones favorables.

Sólidos solubles: 14,20 °Brix.

Acidez: 5,44 g/l ác. málico.

Firmeza: 1,40 kg/cm².

Semillas de forma elíptica, peso medio de 2 g y una media de 3-4 semillas por fruto.

