

'Mrs. COOKSEY'

1. Características vegetativas

Variedad de vigor medio, de porte abierto y 3 brotes laterales por brote central.

El 100% de los brotes centrales y el 70% de los laterales son fructíferos. Variedad muy productiva.

Hojas de tamaño medio con dientes de densidad intermedia. Forma del ápice agudo y sección transversal curva.

2. Floración

Plena floración en la primera semana de noviembre (7 días antes que 'Algerie').

Panícula de forma cónica, de floración media (media de 161 flores/panícula), flores de color blanco y un cuajado del 7,13%.

3. Características del fruto

Maduración en la cuarta semana de abril (7 días antes que 'Algerie').

Fruto ovalado, sección transversal ligeramente angular, zona peduncular aguda, cavidad del cáliz cerrada, y ápice plano. Tanto la piel como la pulpa son de color anaranjado.

Peso medio de 74,62 g, calibre medio de 48,24 mm y espesor de la pulpa de 10,52 mm. Pelado medio y de sabor mediocre. Mucha incidencia de mancha púrpura, nula tendencia al rajado y mediana sensibilidad al moteado en condiciones favorables.

Sólidos solubles: 11,60 °Brix.

Acidez: 6,77 g/l ác. málico.

Firmeza: 1,80 kg/cm².

Semillas de forma ovalada, peso medio de 3,07 g y una media de 3-4 semillas por fruto.

