

'Mc. BETH'

1. Características vegetativas

Variedad de vigor medio, de porte abierto y 3-4 brotes laterales por brote central.

El 100% de los brotes centrales y el 62% de los laterales son fructíferos. Variedad muy productiva.

Hojas de tamaño grande con dientes de densidad intermedia. Forma del ápice agudo y sección transversal curva.

2. Floración

Plena floración en la primera semana de noviembre (4 días antes que 'Algerie').

Panícula de forma intermedia, de floración media (media de 157 flores/panícula), flores de color blanco y un cuajado del 11,50%.

3. Características del fruto

Maduración en la tercera semana de abril (16 días antes que 'Algerie').

Fruto ovalado, sección transversal angular, zona peduncular obtusa, cavidad del cáliz cerrada, y ápice convexo. Tanto la piel como la pulpa son de color anaranjado.

Peso medio de 54,25 g, calibre medio de 42,11 mm y espesor de la pulpa de 8,35 mm. Pelado fácil y de sabor aceptable. Nula incidencia de mancha púrpura, nula tendencia al rajado y muy sensible al moteado en condiciones favorables.

Sólidos solubles: 12,53 °Brix.

Acidez: 8,51 g/l ác. málico.

Firmeza: 1,45 kg/cm².

Semillas de forma elíptica, peso medio de 1,82 g y una media de 4-5 semillas por fruto.

