

‘ALCÁCER-2’

1. Características vegetativas

Variedad de vigor medio, porte semi abierto y con 2 a 3 brotes laterales por brote central.

El 100% de los brotes centrales son fructíferos y un 70% de los brotes laterales también lo son. Variedad bastante productiva.

Hojas de tamaño medio, con dientes medianamente espaciados. Forma del ápice aguda y sección transversal curva.

2. Floración

Plena floración en la tercera semana de noviembre (6 días después que ‘Algerie’).

Panícula cónica de floración abundante (media de 179 flores/panícula), de color blanco amarillento y un cuajado del 5,57%.

3. Características del fruto

Plena maduración en la primera semana de mayo (igual que ‘Algerie’).

Fruto ovalado, sección transversal ligeramente angular, zona peduncular aguda, cavidad del cáliz cerrada y ápice plano. Tanto la piel como la pulpa son de color anaranjado.

Peso medio de 55,83 g, calibre medio de 44,14 mm y espesor de la pulpa de 8,4 mm. Pelado fácil y sabor aceptable. Bastante sensible a la mancha púrpura y nula incidencia de rajado y moteado.

Sólidos solubles: 11,23 °Brix.

Acidez: 5,74 g/l ác. málico

Firmeza: 1,24 Kg/cm²

Semillas de forma elíptica, peso medio de 2,50 g y una media de 4 semillas por fruto.

