

'CHIRLERO'

1. Características vegetativas

Variedad vigorosa, de porte abierto y 2-3 brotes laterales por brote central.

El 100% de los brotes centrales y el 47% de los laterales son fructíferos. Variedad muy productiva.

Hojas de tamaño grande con dientes de densidad intermedia. Forma del ápice aguda e intermedia y sección transversal curva.

2. Floración

Plena floración en la primera semana de noviembre (7 días antes que 'Algerie').

Panícula de forma cónica, de floración media (media de 172 flores/panícula), flores de color blanco y un cuajado del 16,82%.

3. Características del fruto

Maduración en la cuarta semana de abril (10 días antes que 'Algerie').

Fruto ovalado, sección transversal ligeramente angular, zona peduncular obtusa, cavidad del cáliz cerrada y ápice plano. Tanto la piel como la pulpa son de color anaranjado.

Peso medio de 78,35 g, calibre medio de 47,51 mm y espesor de la pulpa de 12,04 mm. Pelado fácil y de sabor bueno. Muy ligera incidencia de mancha púrpura, nula tendencia al rajado y muy ligera sensibilidad al moteado en condiciones favorables.

Sólidos solubles: 13,17 °Brix.

Acidez: 14,27 g/l ác. málico.

Firmeza: 1,60 kg/cm².

Semillas de forma elíptica, peso medio de 2,67 g y una media de 4-5 semillas por fruto.

