

'JIRO (C-24276)'

1. *Características vegetativas.*

Variedad vigorosa de porte semi erecto y con sólo flores femeninas.

Yemas de forma ovalada ancha, cuya fecha media de brotación es el 23 de marzo (+1 día respecto a 'Rojo Brillante').

Las hojas son de forma elíptica ancha, de base aguda ancha y ápice acuminado. Su longitud y anchura media es de 16,42 cm y 9,44 cm, respectivamente (relación longitud / anchura: 1,75).

2. *Floración.*

Fecha media de plena floración el 3 de mayo (-2 días respecto a 'Rojo Brillante'). Las flores presentan una corola con un diámetro medio de 18,38 mm, con cuatro lóbulos y cáliz de forma rómbica y rómbica redondeada.

3. *Características del fruto.*

Según el tipo de astringencia en el momento de madurez comercial, es una variedad de tipo PCNA.

Fecha media de madurez comercial el 23 de octubre (-6 días respecto a 'Rojo Brillante'), fecha media de madurez fisiológica el 4 de enero (igual que 'Rojo Brillante').

Peso medio del fruto 186,29 g, calibre medio 75,99 mm, relación longitud / anchura 0,65.

Fruto achatado, de sección transversal cuadrada. En su sección longitudinal el ápice es truncado, con una moderada acanaladura del mismo, sin agrietamiento concéntrico alrededor del ápice ni agrietamiento de la zona del mismo ápice. Acanalado longitudinal medio.

El cáliz está prácticamente al mismo nivel, sin acanaladura y sin agrietamiento en su extremo. El tamaño del cáliz en relación con el diámetro del fruto es medio y su porte es horizontal.

En madurez comercial el color de la piel es naranja y la pulpa es naranja amarillenta.

Sólidos solubles: 15,53 °Brix

Acidez: 1,06 g/l ác. málico

Firmeza: 6,04 kgf

