

'O'GOSHO'

1. *Características vegetativas.*

Variedad vigorosa de porte semi erecto y con sólo flores femeninas

Yemas de forma ovalada ancha, cuya fecha media de brotación es el 5 de abril (+14 días respecto a 'Rojo Brillante').

Las hojas son de forma elíptica ancha, de base aguda ancha y ápice acuminado. Su longitud y anchura media es de 16,90 cm y 9,95 cm, respectivamente (relación longitud / anchura: 1,72).

2. *Floración.*

Fecha media de plena floración el 7 de mayo (+2 días respecto a 'Rojo Brillante'). Las flores presentan una corola con un diámetro medio de 16,04 mm, con cuatro lóbulos y cáliz de forma cruciforme irregular.

3. *Características del fruto.*

Según el tipo de astringencia en el momento de madurez comercial, es una variedad de tipo PCNA.

Fecha media de madurez comercial el 5 de noviembre (+7 días respecto a 'Rojo Brillante'), fecha media de madurez fisiológica el 30 de diciembre (-5 días respecto a 'Rojo Brillante').

Peso medio del fruto 244,08 g, calibre medio 88,16 mm, relación longitud / anchura 0,67.

Fruto achatado, de sección transversal cuadrada. En su sección longitudinal el ápice es obtuso, con una débil e incluso ausente acanaladura del mismo, sin agrietamiento concéntrico alrededor del ápice ni agrietamiento de la zona del mismo ápice. Acanalado longitudinal ausente o muy superficial.

El cáliz está ligeramente deprimido y, dependiendo de años, algunos frutos forman una protuberancia en su extremo. No presenta agrietamiento en su extremo. El tamaño del cáliz en relación con el diámetro del fruto es grande y su porte es erecto.

En madurez comercial el color de la piel es naranja y la pulpa es naranja pardo.

Sólidos solubles: 15,55 °Brix

Acidez: 1,15 g/l ác. málico

Firmeza: 6,60 kgf

