

## 'REUS-15'

### 1. *Características vegetativas.*

Variedad vigorosa de porte semi erecto y con sólo flores femeninas.

Yemas de forma triangular, cuya fecha media de brotación es el 21 de marzo (-1 día respecto a 'Rojo Brillante').

Las hojas son de forma elíptica, de base aguda estrecha y ancha, y ápice acuminado. Su longitud y anchura media es de 14,48 cm y 7,88 cm, respectivamente (relación longitud / anchura: 1,85).

### 2. *Floración.*

Fecha media de plena floración el 7 de mayo (+2 respecto a 'Rojo Brillante'). Las flores presentan una corola con un diámetro medio de 15,03 mm, generalmente con cuatro lóbulos, aunque también presentan flores con más de cuatro, y cáliz de forma cruciforme irregular.

### 3. *Características del fruto.*

Según el tipo de astringencia en el momento de madurez comercial, es una variedad de tipo PVA.

Fecha media de madurez comercial el 29 de octubre (igual que 'Rojo Brillante'), fecha media de madurez fisiológica el 24 de diciembre (-11 días respecto a 'Rojo Brillante').

Peso medio del fruto 176,84 g, calibre medio 69,18 mm, relación longitud / anchura 0,92.

Fruto redondeado, de sección transversal redondeada irregular. En su sección longitudinal el ápice es retuso, con una débil e incluso ausente acanaladura del mismo, sin agrietamiento concéntrico alrededor del ápice. No muestra agrietamiento de la zona del ápice. Acanalado longitudinal ausente o muy superficial.

El cáliz está ligeramente deprimido, sin acanaladura y sin agrietamiento en su extremo. El tamaño del cáliz en relación con el diámetro del fruto es grande y su porte es semi erecto.

En madurez comercial el color de la piel es naranja y la pulpa es naranja amarillenta.

Sólidos solubles: 19,80 °Brix

Acidez: 1,55 g/l ác. málico

Firmeza: 2,49 kgf

