

'XATO DE BONREPÓS'

1. *Características vegetativas.*

Variedad medianamente vigorosa de porte semi erecto y con sólo flores femeninas.

Yemas de forma triangular, cuya fecha media de brotación es el 28 de marzo (+6 días respecto a 'Rojo Brillante').

Las hojas son de forma elíptica, de base obtusa y ápice acuminado. Su longitud y anchura media es de 12,58 cm y 6,90 cm, respectivamente (relación longitud / anchura: 1,83).

2. *Floración.*

Fecha media de plena floración el 3 de mayo (-2 días respecto a 'Rojo Brillante'). Las flores presentan una corola con un diámetro medio de 16,28 mm, con cuatro lóbulos y cáliz de forma rómbica y rómbica redondeada.

3. *Características del fruto.*

Según el tipo de astringencia en el momento de madurez comercial, es una variedad de tipo PVA.

Fecha media de madurez comercial el 20 de octubre (-9 días respecto a 'Rojo Brillante'), fecha media de madurez fisiológica el 18 de diciembre (-17 días respecto a 'Rojo Brillante').

Peso medio del fruto 124,21 g, calibre medio 65,06 mm, relación longitud / anchura 0,75.

Fruto achatado, de sección transversal redondeada irregular. En su sección longitudinal el ápice es truncado, con una moderada acanaladura del mismo, sin agrietamiento concéntrico alrededor del ápice. No muestra agrietamiento de la zona del ápice. Acanalado longitudinal ausente o muy superficial.

El cáliz está ligeramente deprimido, sin acanaladura y sin agrietamiento en su extremo. El tamaño del cáliz en relación con el diámetro del fruto es medio y su porte es semi erecto.

En madurez comercial el color de la piel es naranja y la pulpa es naranja amarillenta.

Sólidos solubles: 19,43 °Brix

Acidez: 2,83 g/l ác. málico

Firmeza: 3,71 kgf

