

'MAEKAWA JIRO'

1. *Características vegetativas.*

Variedad muy vigorosa de porte semi erecto y con sólo flores femeninas.

Yemas de forma ovalada ancha, cuya fecha media de brotación es el 28 de marzo (+6 días respecto a 'Rojo Brillante').

Las hojas son de forma elíptica ancha, de base aguda ancha y ápice acuminado. Su longitud y anchura media es de 16,20 cm y 9,35 cm, respectivamente (relación longitud / anchura: 1,73).

2. *Floración.*

Fecha media de plena floración el 29 de abril (-6 días respecto a 'Rojo Brillante'). Las flores presentan una corola con un diámetro medio de 13,52 mm, con cuatro lóbulos y cáliz de forma rómbico y cruciforme regular.

3. *Características del fruto.*

Según el tipo de astringencia en el momento de madurez comercial, es una variedad de tipo PCNA.

Fecha media de madurez comercial el 7 de noviembre (+8 días respecto a 'Rojo Brillante'), fecha media de madurez fisiológica el 30 de enero (+26 días respecto a 'Rojo Brillante').

Peso medio del fruto 222,27 g, calibre medio 80,19 mm, relación longitud / anchura 0,66.

Fruto achatado, de sección transversal cuadrada. En su sección longitudinal el ápice es truncado, con moderada acanaladura del mismo, y ausencia de agrietamiento concéntrico alrededor del ápice. No muestra agrietamiento de la zona del ápice. Acanalado longitudinal ausente o muy superficial.

El cáliz está al mismo nivel del fruto, sin acanaladura y sin agrietamiento en su extremo. El tamaño del cáliz en relación con el diámetro del fruto es de medio a grande y su porte es horizontal.

En madurez comercial el color de la piel es naranja amarillento y la pulpa es amarilla.

Sólidos solubles: 17,60 °Brix

Acidez: 0,57 g/l ác. málico

Firmeza: 6,03 kgf

