

'JIRO'

1. *Características vegetativas.*

Variedad de vigor medio, porte semi erecto y con sólo flores femeninas.

Yemas de forma ovalada ancha, cuya fecha media de brotación es el 4 de abril (+13 días respecto a 'Rojo Brillante').

Las hojas son de forma elíptica ancha, de base aguda ancha y ápice acuminado. Su longitud y anchura media es de 12,42 cm y 8,35 cm, respectivamente (relación longitud / anchura: 1,49).

2. *Floración.*

Fecha media de plena floración el 1 de mayo (-4 días respecto a 'Rojo Brillante'). Las flores presentan una corola con un diámetro medio de 12,59 mm, con cuatro lóbulos y cáliz de forma rómbica y cruciforme regular.

3. *Características del fruto.*

Según el tipo de astringencia en el momento de madurez comercial, es una variedad de tipo PCNA.

Fecha media de madurez comercial el 27 de octubre (-2 días respecto a 'Rojo Brillante').

Peso medio del fruto 124,03 g, calibre medio 69,19 mm, relación longitud / anchura 0,63.

Fruto achatado, de sección transversal cuadrada. En su sección longitudinal el ápice es truncado en cubeta, con una moderada acanaladura del mismo, sin agrietamiento concéntrico alrededor del ápice ni agrietamiento de la zona del mismo ápice. Acanalado longitudinal medio.

El cáliz está prácticamente al mismo nivel, sin acanaladura y sin agrietamiento en su extremo. El tamaño del cáliz en relación con el diámetro del fruto es medio y su porte es horizontal.

En madurez comercial el color de la piel es naranja y la pulpa es naranja amarillenta.

Sólidos solubles: 19,35 °Brix

Acidez: 0,78 g/l ác. málico

Firmeza: 5,96 kgf

