

## ‘D. kaki x D. virginiana’

### 1. *Características vegetativas.*

Variedad muy vigorosa de porte semi erecto y con sólo flores femeninas.

Yemas de forma ovalada ancha, cuya fecha media de brotación es el 4 de abril (+12 días respecto a ‘Rojo Brillante’).

Las hojas son de forma elíptica ancha, de base aguda ancha con el ápice acuminado y agudo. Su longitud y anchura media es de 13,32 cm y 7,9 cm, respectivamente (relación longitud / anchura: 1,69).

### 2. *Floración.*

Fecha media de plena floración el 6 de mayo (+1 día respecto a ‘Rojo Brillante’). Las flores presentan una corola con un diámetro medio de 11,50 mm, con cuatro lóbulos y cáliz de forma cruciforme regular.

### 3. *Características del fruto.*

Según el tipo de astringencia en el momento de madurez comercial es una variedad de tipo PCA.

Fecha media de madurez comercial el 6 de noviembre (+7 días respecto a ‘Rojo Brillante’), fecha media de madurez fisiológica el 30 de diciembre (-4 días respecto a ‘Rojo Brillante’).

Peso medio del fruto 135,01 g, calibre medio 68,50 mm, relación longitud / anchura 0,70.

Fruto redondeado, de sección transversal circular. En su sección longitudinal el ápice es redondeado, ausencia de acanalado del mismo, y ausencia de agrietamiento concéntrico alrededor del ápice. No muestra agrietamiento de la zona del ápice. Ausencia de acanalado longitudinal.

El cáliz está ligeramente deprimido, sin acanaladura y sin agrietamiento en su extremo. El tamaño del cáliz en relación con el diámetro del fruto es pequeño y su porte es erecto.

En madurez comercial el color de la piel es naranja y la pulpa es naranja amarillenta.

Sólidos solubles: 21,05 °Brix

Acidez: 0,96 g/l ác. málico

Firmeza: 3,19 kgf

