

'BAN GOSHO'

1. *Características vegetativas.*

Variedad de vigor medio de porte semi erecto y con sólo flores femeninas.

Yemas de forma triangular, cuya fecha media de brotación es el 5 de abril (+13 días respecto a 'Rojo Brillante').

Las hojas son de forma redondeada, de base redondeada con el ápice agudo. Su longitud y anchura media es de 14,29 cm y 10,65 cm, respectivamente (relación longitud / anchura: 1,34).

2. *Floración.*

Fecha media de plena floración el 30 de abril (-5 días respecto a 'Rojo Brillante'). Las flores presentan una corola con un diámetro medio de 13,12 mm, con cuatro lóbulos y cáliz de forma circular y cruciforme regular.

3. *Características del fruto.*

Según el tipo de astringencia en el momento de madurez comercial es una variedad de tipo PCNA.

Fecha media de madurez comercial el 14 de noviembre (+15 días respecto a 'Rojo Brillante'), fecha media de madurez fisiológica el 20 de enero (+16 días respecto a 'Rojo Brillante').

Peso medio del fruto 131,34 g, calibre medio 68,75 mm, relación longitud / anchura 0,68.

Fruto achatado, de sección transversal redondeada irregular. En su sección longitudinal el ápice es truncado, moderado acanalado del mismo, y ausencia de agrietamiento concéntrico alrededor del ápice. No muestra agrietamiento de la zona del ápice. Ausencia de acanalado longitudinal.

El cáliz está al mismo nivel del fruto, sin acanaladura y sin agrietamiento en su extremo. El tamaño del cáliz en relación con el diámetro del fruto es medio y su porte es semi erecto.

En madurez comercial tanto el color de la piel como el de la pulpa son de color naranja.

Sólidos solubles: 18,77 °Brix

Acidez: 1,00 g/l ác. málico

Firmeza: 5,80 kgf

