

'MUKAKU JIRO'

1. *Características vegetativas.*

Variedad de vigor medio de porte semi erecto y con sólo flores femeninas.

Yemas de forma ovalada ancha, cuya fecha media de brotación es el 13 de abril (+22 días respecto a 'Rojo Brillante').

Las hojas son de forma elíptica ancha, de base obtusa con el ápice acuminado. Su longitud y anchura media es de 12,93 cm y 9,02 cm, respectivamente (relación longitud / anchura: 1,43).

2. *Floración.*

Fecha media de plena floración el 10 de mayo (+5 días respecto a 'Rojo Brillante'). Las flores presentan una corola con un diámetro medio de 12,76 mm, con cuatro lóbulos y cáliz de forma rómbica.

3. *Características del fruto.*

Según el tipo de astringencia en el momento de madurez comercial es una variedad de tipo PCNA.

Fecha media de madurez comercial el 20 de octubre (-9 días respecto a 'Rojo Brillante'), fecha media de madurez fisiológica el 15 de enero (+11 días respecto a 'Rojo Brillante').

Peso medio del fruto 171,94 g, calibre medio 74,26 mm, relación longitud / anchura 0,65.

Fruto achatado, de sección transversal cuadrada. En su sección longitudinal el ápice es truncado, sin acanaladura del mismo, y ausencia de agrietamiento concéntrico alrededor del ápice. No muestra agrietamiento de la zona del ápice. Ausencia de acanalado longitudinal.

El cáliz está al mismo nivel del fruto, sin acanaladura y sin agrietamiento en su extremo. El tamaño del cáliz en relación con el diámetro del fruto es grande y su porte es horizontal.

En madurez comercial el color de la piel es naranja y la pulpa es naranja amarillenta.

Sólidos solubles: 16,15 °Brix

Acidez: 0,60 g/l ác. málico

Firmeza: 4,81 kgf

