

'FUKURO GOSHO'

1. *Características vegetativas.*

Variedad poco vigorosa de porte semi erecto y con flores femeninas y masculinas.

Yemas de forma ovalada ancha, cuya fecha media de brotación es el 12 de abril (+21 días respecto a 'Rojo Brillante').

Las hojas son de forma elíptica ancha, de base redondeada con el ápice acuminado. Su longitud y anchura media es de 15,51 cm y 10,74 cm, respectivamente (relación longitud / anchura: 1,44).

2. *Floración.*

Fecha media de plena floración el 7 de mayo (+2 días respecto a 'Rojo Brillante'). Las flores presentan una corola con un diámetro medio de 12,28 mm, con cuatro lóbulos y cáliz de forma cruciforme regular.

3. *Características del fruto.*

Según el tipo de astringencia en el momento de madurez comercial es una variedad de tipo PCNA.

Fecha media de madurez comercial el 31 de octubre (+2 días respecto a 'Rojo Brillante'), fecha media de madurez fisiológica el 20 de enero (+16 días respecto a 'Rojo Brillante').

Peso medio del fruto 160,19 g, calibre medio 70,48 mm, relación longitud / anchura 0,75.

Fruto achatado, de sección transversal redondeada irregular. En su sección longitudinal el ápice es redondeado, sin acanaladura del mismo, y ausencia de agrietamiento concéntrico alrededor del ápice. No muestra agrietamiento de la zona del ápice. Ausencia de acanalado longitudinal.

El cáliz está al mismo nivel del fruto, sin acanaladura y sin agrietamiento en su extremo. El tamaño del cáliz en relación con el diámetro del fruto es grande y su porte es horizontal.

En madurez comercial el color de la piel es naranja y la pulpa es naranja amarillenta.

Sólidos solubles: 18,20 °Brix

Acidez: 0,52 g/l ác. málico

Firmeza: 7,46 kgf

