

## 'YAMATO GOSHO'

### 1. *Características vegetativas.*

Variedad muy vigorosa de porte semi erecto y con sólo flores femeninas.

Yemas de forma ovalada ancha, cuya fecha media de brotación es el 6 de abril (+15 días respecto a 'Rojo Brillante').

Las hojas son de forma elíptica ancha, de base aguda ancha y obtusa con el ápice agudo. Su longitud y anchura media es de 16,18 cm y 9,68 cm, respectivamente (relación longitud / anchura: 1,67).

### 2. *Floración.*

Fecha media de plena floración el 4 de mayo (-1 día respecto a 'Rojo Brillante'). Las flores presentan una corola con un diámetro medio de 14,67 mm, con cuatro lóbulos y cáliz de forma rómbica redondeada.

### 3. *Características del fruto.*

Según el tipo de astringencia en el momento de madurez comercial es una variedad de tipo PCNA.

Fecha media de madurez comercial el 8 de noviembre (+9 días respecto a 'Rojo Brillante'), fecha media de madurez fisiológica el 7 de enero (+4 días respecto a 'Rojo Brillante').

Peso medio del fruto 276,11 g, calibre medio 87,12 mm, relación longitud / anchura 0,74.

Fruto oval muy ancho, de sección transversal cuadrada. En su sección longitudinal el ápice es obtuso, sin acanaladura del mismo, y ausencia de agrietamiento concéntrico alrededor del ápice. No muestra agrietamiento de la zona del ápice. Se aprecia acanalado longitudinal de superficial a medio.

El cáliz está ligeramente deprimido, sin acanaladura en su extremo y con moderado agrietamiento en la zona del cáliz. El tamaño del cáliz en relación con el diámetro del fruto es medio y su porte es semi erecto y horizontal.

En madurez comercial el color de la piel es naranja y la pulpa es naranja amarillenta.

Sólidos solubles: 19,40 °Brix

Acidez: 0,83 g/l ác. málico

Firmeza: 5,72 kgf

