

'HANA GOSHO'

1. *Características vegetativas.*

Variedad de vigor medio de porte semi erecto y con flores femeninas y masculinas.

Yemas de forma triangular, cuya fecha media de brotación es el 12 de abril (+20 días respecto a 'Rojo Brillante').

Las hojas son de forma elíptica redondeada, de base obtusa con el ápice agudo. Su longitud y anchura media es de 11,26 cm y 8,65 cm, respectivamente (relación longitud / anchura: 1,30).

2. *Floración.*

Fecha media de plena floración el 7 de mayo (+2 días respecto a 'Rojo Brillante'). Las flores presentan una corola con un diámetro medio de 10,11 mm, con cuatro lóbulos y cáliz de forma cruciforme irregular.

3. *Características del fruto.*

Según el tipo de astringencia en el momento de madurez comercial es una variedad de tipo PCNA.

Fecha media de madurez comercial el 17 de noviembre (+18 días respecto a 'Rojo Brillante'), fecha media de madurez fisiológica el 7 de enero (+3 días respecto a 'Rojo Brillante').

Peso medio del fruto 168,07 g, calibre medio 74,64 mm, relación longitud / anchura 0,77.

Fruto achatado, de sección transversal redondeada irregular. En su sección longitudinal el ápice es obtuso, ausencia de acanalado del mismo, y ausencia de agrietamiento concéntrico alrededor del ápice. No muestra agrietamiento de la zona del ápice. Ausencia de acanalado longitudinal.

El cáliz está ligeramente deprimido, sin acanaladura y sin agrietamiento en su extremo. El tamaño del cáliz en relación con el diámetro del fruto es medio y su porte es semi erecto.

En madurez comercial el color de la piel es naranja y la pulpa es naranja amarillenta.

Sólidos solubles: 18,90 °Brix

Acidez: 0,86 g/l ác. málico

Firmeza: 4,50 kgf

