

'KAWABATA'

1. *Características vegetativas.*

Variedad de vigor medio de porte erecto y con sólo flores femeninas.

Yemas de forma ovalada ancha, cuya fecha media de brotación es el 12 de abril (+20 días respecto a 'Rojo Brillante').

Las hojas son de forma elíptica ancha, de base aguda ancha con el ápice acuminado. Su longitud y anchura media es de 11,94 cm y 7,28 cm, respectivamente (relación longitud / anchura: 1,64).

2. *Floración.*

Fecha media de plena floración el 9 de mayo (+4 días respecto a 'Rojo Brillante'). Las flores presentan una corola con un diámetro medio de 11,06 mm, con cuatro lóbulos y cáliz de forma cruciforme irregular.

3. *Características del fruto.*

Según el tipo de astringencia en el momento de madurez comercial es una variedad de tipo PCNA.

Fecha media de madurez comercial el 12 de noviembre (+13 días respecto a 'Rojo Brillante'), fecha media de madurez fisiológica el 11 de enero (+7 días respecto a 'Rojo Brillante').

Peso medio del fruto 209,38 g, calibre medio 82,93 mm, relación longitud / anchura 0,71.

Fruto oval muy ancho, de sección transversal redondeada irregular. En su sección longitudinal el ápice es redondeado, ausencia de acanalado del mismo, y ausencia de agrietamiento concéntrico alrededor del ápice. No muestra agrietamiento de la zona del ápice. Ausencia de acanalado longitudinal.

El cáliz está ligeramente deprimido y presenta protuberancia alrededor del extremo del cáliz, sin agrietamiento en su extremo. El tamaño del cáliz en relación con el diámetro del fruto es medio y su porte es semi erecto.

En madurez comercial el color de la piel es naranja y la pulpa es amarilla.

Sólidos solubles: 17,20 °Brix

Acidez: 0,95 g/l ác. málico

Firmeza: 6,98 kgf

