

'ZUEZDOCKA'

1. *Características vegetativas.*

Variedad vigorosa de porte semi erecto y con flores femeninas y masculinas.

Yemas de forma ovalada triangular, cuya fecha media de brotación es el 3 de abril (+11 días respecto a 'Rojo Brillante').

Las hojas son de forma elíptica ancha, de base obtusa con el ápice acuminado. Su longitud y anchura media es de 13,75 cm y 9,00 cm, respectivamente (relación longitud / anchura: 1,53).

2. *Floración.*

Fecha media de plena floración el 28 de abril (-7 días respecto a 'Rojo Brillante'). Las flores presentan una corola con un diámetro medio de 13,71 mm, con cuatro o más lóbulos y cáliz de forma cruciforme regular.

3. *Características del fruto.*

Según el tipo de astringencia en el momento de madurez comercial es una variedad de tipo PVA.

Fecha media de madurez comercial el 21 de octubre (-8 días respecto a 'Rojo Brillante'), fecha media de madurez fisiológica el 10 de enero (+6 días respecto a 'Rojo Brillante').

Peso medio del fruto 195,20 g, calibre medio 73,87 mm, relación longitud / anchura 0,84.

Fruto oval muy ancho, de sección transversal redondeada irregular. En su sección longitudinal el ápice es redondeado, débil acanalado del mismo, y ausencia de agrietamiento concéntrico alrededor del ápice. No muestra agrietamiento de la zona del ápice. Ausencia de acanalado longitudinal.

El cáliz está fuertemente deprimido, sin acanaladura y sin agrietamiento en su extremo. El tamaño del cáliz en relación con el diámetro del fruto es medio y su porte es semi erecto.

En madurez comercial el color de la piel es naranja rojizo y la pulpa es naranja amarillenta.

Sólidos solubles: 20,38 °Brix

Acidez: 2,62 g/l ác. málico

Firmeza: 4,66 kgf

