

## 'LYCOPERSICON'

### 1. *Características vegetativas.*

Variedad medianamente vigorosa de porte semi erecto y con sólo flores femeninas.

Yemas de forma ovalada ancha, cuya fecha media de brotación es el 5 de abril (+13 días respecto a 'Rojo Brillante').

Las hojas son de forma elíptica, de base aguda ancha con el ápice acuminado. Su longitud y anchura media es de 12,84 cm y 7,05 cm, respectivamente (relación longitud / anchura: 1,82).

### 2. *Floración.*

Fecha media de plena floración el 6 de mayo (+1 día respecto a 'Rojo Brillante'). Las flores presentan una corola con un diámetro medio de 12,88 mm, con cuatro lóbulos y cáliz de forma cruciforme irregular.

### 3. *Características del fruto.*

Según el tipo de astringencia en el momento de madurez comercial es una variedad de tipo PCA.

Fecha media de madurez comercial el 5 de octubre (-24 días respecto a 'Rojo Brillante'), fecha media de madurez fisiológica el 12 de enero (-22 días respecto a 'Rojo Brillante').

Peso medio del fruto 132,92 g, calibre medio 63,70 mm, relación longitud / anchura 0,91.

Fruto redondeado, de sección transversal redondeada irregular. En su sección longitudinal el ápice es redondeado, ausencia de acanalado del mismo, y ausencia de agrietamiento concéntrico alrededor del ápice. No muestra agrietamiento de la zona del ápice. Ausencia de acanalado longitudinal.

El cáliz está al mismo nivel del fruto, sin acanaladura y sin agrietamiento en su extremo. El tamaño del cáliz en relación con el diámetro del fruto es grande y su porte es semi erecto y horizontal.

En madurez comercial el color de la piel es naranja y la pulpa es naranja amarillenta.

Sólidos solubles: 19,43 °Brix

Acidez: 1,00 g/l ác. málico

Firmeza: 2,86 kgf

