

## 'COSTATA'

### 1. *Características vegetativas.*

Variedad muy vigorosa de porte erecto y con sólo flores femeninas.

Yemas de forma ovalada ancha, cuya fecha media de brotación es el 3 de abril (+11 días respecto a 'Rojo Brillante').

Las hojas son de forma elíptica, de base aguda ancha, y ápice acuminado. Su longitud y anchura media es de 15,72 cm y 8,95 cm, respectivamente (relación longitud / anchura: 1,76).

### 2. *Floración.*

Fecha media de plena floración el 28 de abril (-7 días respecto a 'Rojo Brillante'). Las flores presentan una corola con un diámetro medio de 13,08 mm, con cuatro lóbulos y cáliz de forma cruciforme regular.

### 3. *Características del fruto.*

Según el tipo de astringencia en el momento de madurez comercial, es una variedad de tipo PCA.

Fecha media de madurez comercial el 30 de octubre (+1 día respecto a 'Rojo Brillante'), fecha media de madurez fisiológica el 19 de diciembre (-15 días respecto a 'Rojo Brillante').

Peso medio del fruto 175,72 g, calibre medio 69,15 mm, relación longitud / anchura 0,94.

Fruto oval ancho, de sección transversal cuadrada. En su sección longitudinal el ápice es obtuso, con ausente acanaladura del mismo, sin agrietamiento concéntrico alrededor del ápice. No muestra agrietamiento de la zona del ápice. Acanalado longitudinal profundo.

El cáliz está ligeramente deprimido, sin acanaladura y sin agrietamiento en su extremo. El tamaño del cáliz en relación con el diámetro del fruto es medio y su porte es erecto.

En madurez comercial el color de la piel es naranja rojizo y el de la pulpa es naranja.

Sólidos solubles: 22,65 °Brix

Acidez: 1,48 g/l ác. málico

Firmeza: 2,82 kgf

