

'VAINIGLIA'

1. *Características vegetativas.*

Variedad medianamente vigorosa de porte semi erecto y con flores femeninas, hermafroditas y masculinas.

Yemas de forma ovalada ancha, cuya fecha media de brotación es el 5 de abril (+13 días respecto a 'Rojo Brillante').

Las hojas son de forma elíptica, de base obtusa con el ápice acuminado. Su longitud y anchura media es de 9,81 cm y 5,75 cm, respectivamente (relación longitud / anchura: 1,71).

2. *Floración.*

Fecha media de plena floración el 30 de abril (-5 días respecto a 'Rojo Brillante'). Las flores presentan una corola con un diámetro medio de 13,41 mm, con cuatro lóbulos y algunas con más de cuatro lóbulos, cáliz de forma cruciforme irregular.

3. *Características del fruto.*

Según el tipo de astringencia en el momento de madurez comercial es una variedad de tipo PVNA.

Fecha media de madurez comercial el 30 de octubre (+1 día respecto a 'Rojo Brillante'), fecha media de madurez fisiológica el 15 de enero (+11 días respecto a 'Rojo Brillante').

Peso medio del fruto 205,43 g, calibre medio 76,85 mm, relación longitud / anchura 0,79.

Fruto redondeado, de sección transversal circular. En su sección longitudinal el ápice es redondeado, moderado acanalado del mismo, y ausencia de agrietamiento concéntrico alrededor del ápice. Presenta agrietamiento de la zona del ápice, especialmente en frutos con semillas. Ausencia de acanalado longitudinal.

El cáliz está ligeramente deprimido, sin acanaladura y sin agrietamiento en su extremo. El tamaño del cáliz en relación con el diámetro del fruto es medio y su porte es semi erecto.

En madurez comercial el color de la piel es naranja y la pulpa es amarilla.

Sólidos solubles: 17,27 °Brix

Acidez: 0,66 g/l ác. málico

Firmeza: 4,24 kgf

