

'CIOCCOLATINO'

1. *Características vegetativas.*

Variedad vigorosa de porte semi erecto y con flores femeninas, hermafroditas y especialmente masculinas en abundancia.

Yemas de forma ovalada ancha, cuya fecha media de brotación es el 8 de abril (+16 días respecto a 'Rojo Brillante').

Las hojas son de forma elíptica, de base aguda ancha con el ápice acuminado. Su longitud y anchura media es de 12,56 cm y 6,72 cm, respectivamente (relación longitud / anchura: 1,87).

2. *Floración.*

Fecha media de plena floración el 7 de mayo (+2 días respecto a 'Rojo Brillante'). Las flores presentan una corola con un diámetro medio de 11,10 mm, con cuatro lóbulos y cáliz de forma cruciforme irregular.

3. *Características del fruto.*

Según el tipo de astringencia en el momento de madurez comercial es una variedad de tipo PVNA.

Fecha media de madurez comercial el 4 de noviembre (+5 días respecto a 'Rojo Brillante'), fecha media de madurez fisiológica el 18 de enero (+14 días respecto a 'Rojo Brillante').

Peso medio del fruto 113,40 g, calibre medio 58,73 mm, relación longitud / anchura 0,92.

Fruto redondeado, de sección transversal circular. En su sección longitudinal el ápice es redondeado, con moderado acanalado del mismo, y ausencia de agrietamiento concéntrico alrededor del ápice. Presenta agrietamiento de la zona del ápice especialmente en frutos con semillas. Ausencia de acanalado longitudinal.

El cáliz está al mismo nivel del fruto, sin acanaladura y sin agrietamiento en su extremo. El tamaño del cáliz en relación con el diámetro del fruto es grande y su porte es horizontal.

En madurez comercial el color de la piel es rojo anaranjado y la pulpa es naranja amarillenta.

Sólidos solubles: 19,35 °Brix

Acidez: 0,88 g/l ác. málico

Firmeza: 6,83 kgf

