

‘ATAGO’

1. *Características vegetativas.*

Variedad de vigor medio de porte semi erecto y con sólo flores femeninas.

Yemas de forma ovalada ancha, cuya fecha media de brotación es el 12 de abril (+20 días respecto a ‘Rojo Brillante’).

Las hojas son de forma elíptica ancha, de base aguda ancha con el ápice acuminado. Su longitud y anchura media es de 12,97 cm y 8,04 cm, respectivamente (relación longitud / anchura: 1,61).

2. *Floración.*

Fecha media de plena floración el 8 de mayo (+3 días respecto a ‘Rojo Brillante’). Las flores presentan una corola con un diámetro medio de 11,72 mm, con cuatro lóbulos y cáliz de forma cruciforme irregular.

3. *Características del fruto.*

Según el tipo de astringencia en el momento de madurez comercial es una variedad de tipo PVA.

Fecha media de madurez comercial el 14 de noviembre (+15 días respecto a ‘Rojo Brillante’), fecha media de madurez fisiológica el 3 de enero (-1 día respecto a ‘Rojo Brillante’).

Peso medio del fruto 158,36 g, calibre medio 70,06 mm, relación longitud / anchura 0,76.

Fruto oblongo ancho transversal, de sección transversal cuadrada. En su sección longitudinal el ápice es truncado con hoyuelo, moderado acanalado del mismo, y ausencia de agrietamiento concéntrico alrededor del ápice. No muestra agrietamiento de la zona del ápice. Acanalado longitudinal medio.

El cáliz está al mismo nivel que el fruto, sin acanaladura y sin agrietamiento en su extremo. El tamaño del cáliz en relación con el diámetro del fruto es medio y su porte es horizontal.

En madurez comercial el color de la piel es naranja y la pulpa es naranja amarillenta.

Sólidos solubles: 20,75 °Brix

Acidez: 1,81 g/l ác. málico

Firmeza: 4,00 kgf

