

'POMELO'

1. *Características vegetativas.*

Varietal vigorosa de porte semi erecto y con flores femeninas, hermafroditas y especialmente masculinas en abundancia.

Yemas de forma triangular, cuya fecha media de brotación es el 30 de marzo (+8 días respecto a 'Rojo Brillante').

Las hojas son de forma elíptica ancha, de base aguda ancha con el ápice agudo. Su longitud y anchura media es de 15,94 cm y 7,8 cm, respectivamente (relación longitud / anchura: 2,04).

2. *Floración.*

Fecha media de plena floración el 2 de mayo (-3 días respecto a 'Rojo Brillante'). Las flores presentan una corola con un diámetro medio de 10,31 mm, con cuatro lóbulos y cáliz de forma cruciforme irregular.

3. *Características del fruto.*

Según el tipo de astringencia en el momento de madurez comercial es una variedad de tipo PCA.

Fecha media de madurez comercial el 14 de noviembre (+15 días respecto a 'Rojo Brillante'), fecha media de madurez fisiológica el 15 de enero (+11 días respecto a 'Rojo Brillante').

Peso medio del fruto 193,72 g, calibre medio 68,33 mm, relación longitud / anchura 0,92.

Fruto redondeado, de sección transversal redondeada irregular. En su sección longitudinal el ápice es redondeado, sin acanalado del mismo, y ausencia de agrietamiento concéntrico alrededor del ápice. No presenta agrietamiento de la zona del ápice. Ausencia de acanalado longitudinal.

El cáliz está fuertemente deprimido, sin acanaladura y sin agrietamiento en su extremo. El tamaño del cáliz en relación con el diámetro del fruto es pequeño y su porte es erecto.

En madurez comercial el color de la piel es naranja rojizo y la pulpa es naranja.

Sólidos solubles: 18,98 °Brix

Acidez: 1,01 g/l ác. málico

Firmeza: 3,56 kgf

