

'GIOMBO'

1. *Características vegetativas.*

Variedad medianamente vigorosa de porte erecto y con sólo flores femeninas.

Yemas de forma ovalada ancha, cuya fecha media de brotación es el 7 de abril (+15 días respecto a 'Rojo Brillante').

Las hojas son de forma elíptica, de base aguda ancha con el ápice acuminado. Su longitud y anchura media es de 14,30 cm y 6,74 cm, respectivamente (relación longitud / anchura: 2,12).

2. *Floración.*

Fecha media de plena floración el 2 de mayo (-3 días respecto a 'Rojo Brillante'). Las flores presentan una corola con un diámetro medio de 11,52 mm, con cuatro lóbulos y cáliz de forma cruciforme irregular.

3. *Características del fruto.*

Según el tipo de astringencia en el momento de madurez comercial es una variedad de tipo PVA.

Fecha media de madurez comercial el 25 de noviembre (+26 días respecto a 'Rojo Brillante'), fecha media de madurez fisiológica el 25 de enero (+21 días respecto a 'Rojo Brillante').

Peso medio del fruto 116,73 g, calibre medio 59,75 mm, relación longitud / anchura 0,99.

Fruto elíptico ancho, de sección transversal circular. En su sección longitudinal el ápice es obtuso, sin acanalado del mismo, y ausencia de agrietamiento concéntrico alrededor del ápice. No presenta agrietamiento de la zona del ápice. Ausencia de acanalado longitudinal.

El cáliz está al mismo nivel del fruto, sin acanaladura y sin agrietamiento en su extremo. El tamaño del cáliz en relación con el diámetro del fruto es medio y su porte es semi erecto.

En madurez comercial el color de la piel es naranja y la pulpa es naranja amarillenta.

Sólidos solubles: 19,70 °Brix

Acidez: 0,90 g/l ác. málico

Firmeza: 4,65 kgf

