

## 'YOKONO'

### 1. *Características vegetativas.*

Variedad vigorosa de porte semi erecto y con sólo flores femeninas.

Yemas de forma ovalada ancha, cuya fecha media de brotación es el 5 de abril (+13 días respecto a 'Rojo Brillante').

Las hojas son de forma elíptica, de base aguda estrecha con el ápice acuminado. Su longitud y anchura media es de 13,01 cm y 7,00 cm, respectivamente (relación longitud / anchura: 1,86).

### 2. *Floración.*

Fecha media de plena floración el 1 de mayo (-4 días respecto a 'Rojo Brillante'). Las flores presentan una corola con un diámetro medio de 13,24 mm, con cuatro lóbulos y cáliz de forma cruciforme irregular.

### 3. *Características del fruto.*

Según el tipo de astringencia en el momento de madurez comercial es una variedad de tipo PCA.

Fecha media de madurez comercial el 6 de noviembre (+7 días respecto a 'Rojo Brillante'), fecha media de madurez fisiológica el 29 de diciembre (-5 días respecto a 'Rojo Brillante').

Peso medio del fruto 131,85 g, calibre medio 64,75 mm, relación longitud / anchura 0,81.

Fruto redondeado, de sección transversal circular. En su sección longitudinal el ápice es redondeado, con moderado acanalado del mismo, y ausencia de agrietamiento concéntrico alrededor del ápice. No presenta agrietamiento de la zona del ápice. Ausencia de acanalado longitudinal.

El cáliz está al mismo nivel del fruto, sin acanaladura y sin agrietamiento en su extremo. El tamaño del cáliz en relación con el diámetro del fruto es medio y su porte es semi erecto.

En madurez comercial el color de la piel es naranja y la pulpa es naranja amarillenta.

Sólidos solubles: 18,53 °Brix

Acidez: 1,47 g/l ác. málico

Firmeza: 3,28 kgf

