



# Arròs

## Avís de tractament

### Piricularia

#### *Magnaporthe oryzae*

Ja s'han detectat els primers símptomes en fulla. Tractar en el cas que s'observen atacs intensos (taques en fulles). La malaltia es detecta per l'aparició de taques necròtiques en les fulles, la tija o l'espiga; aquestes tenen forma oval amb els marges marrons i el centre grisenc. En general, els moments de tractament que es consideren més eficaços vénen determinats per la fenologia del cultiu.

Els estadis fenològics crítics són:

- Fase vegetativa: final fillol (afillolat) / inici formació espiga (inici ventrellat)
- Fase reproductiva: aparició de primeres espigues
- Fase de maduració: grà lletós.



Piricularia



Helminthosporium

### Helminthosporium

#### *Bipolaris oryzae*

Es detecta per l'aparició de lesions de forma ovalada de color fosc i rodejades d'un halo groguenc que s'estenen per tota la fulla i són més xicotets que les de la piricularia.

### Productes autoritzats

Procloraz 45% (EC) P/V  
Procloraz 46% (WP) P/P  
Azoxistrobin 20% + Difenconazol 12,5% (Sc) P/V  
Azoxistrobin 25% (EC) P/V  
Trifloxistribin 50% (WG) P/P

Si és el cas, triar un fungicida que presente control de les dos malalties.

Silla (València), 16 de juliol de 2019

