

# OLIVO

## Aviso de tratamiento Mosca del Olivo (*Bactrocera oleae* Gmel.)

El índice de picada es muy irregular, por lo que hay que estar atentos a su evolución en nuestras parcelas. Es muy importante mantener operativas las botellas tipo "olipe" en las zonas de trapeo masivo, ya que a partir de ahora se suelen producir incrementos importantes de población.

En el caso de detectar picada nueva se puede optar por tratamiento de parcheo o tratamiento total. En tratamientos tardíos, hay que tener en cuenta en la elección del producto fitosanitario su plazo de seguridad.

### Productos:

**Tratamiento de parcheo (cebo):** deltametrin 10% + proteína (p.s. 7 días); lambda cihalotrin 1,5% + proteína (p.s. 7 días); spinosad (p.s. 7 días).

**Tratamientos a todo el árbol:** acetamiprid 20% (p.s. 28 días); cipermetrin 5% (p.s. 3 días); deltametrin (p.s. 7 días); fosmet 50% (p.s. 21 días); lambda cihalotrin 1,5% (p.s. 7 días) y 5% (14 días).

Si optamos por el tratamiento total, se puede aprovechar para realizar al mismo tiempo un tratamiento contra el repilo con algún compuesto de cobre autorizado, especialmente en zonas poco aireadas y propensas a nieblas.

Silla (Valencia), 14 de septiembre de 2020

