



OLIVERA

Avís de tractament

Repilo

El Repilo és una malaltia causada pel fong *Fusicladium oleagineum* (*Spilosea oleagina*, anteriorment). Els símptomes més característics de la malaltia consisteixen en taques circulars de color fosc, rodejades de vegades per un halo groguenc que es desenvolupa en el feix dels fulls. En el revés apareixen taques difuses que són menys distintives.

Com a mesures culturals preventives, és molt important realitzar la poda de manera que s'afavorisca l'aireig de l'interior de l'arbre, perquè els fulls es mantinguen humides el menor temps possible.

També és important ser cuidadós amb l'adobament nitrogenat ja que aquest, en excés, afavorix el desenvolupament de la malaltia.

Les èpoques de major sensibilitat a aquesta malaltia són primavera i tardor, èpoques amb temperatures mitges i humitats relatives elevades; és per tant en aquestes èpoques quan han de fer-se tractaments en cas de ser necessaris. Per tant, en zones de boires persistents o en les que s'observe la presència de la malaltia, es recomana realitzar tractaments fungicides preventius amb algun dels següents **productes**:

- productes penetrants: bentiavalicarb, difeconazol, dodina, kresoxim-metil, tebuconazol, trifloxistrobin
- productes de contacte: compostos de coure, mancozeb, compostos de coure + fungicides orgànics (mancozeb, propineb)



Silla (València), 17 d'abril de 2019