

VIÑA

Aviso de tratamiento La Vall d'Albaida


Polilla del racimo (*Lobesia botrana*): 2ª Generación

Durante la 1ª semana del mes de junio se produjo el inicio del vuelo de adultos de la 2ª generación de la polilla del racimo, en los viñedos de La Vall d'Albaida.


El día 11 de junio fueron detectadas las primeras puestas sobre racimos, las cuales, estaban recién puestas y de color blanco-anacarado, y a mediados de junio predominaban las puestas de color amarillo, por lo que se prevé que las primeras eclosiones se produzcan el próximo fin de semana.

Al igual que en otras zonas vitícolas, las curvas de vuelo y puestas presentan un adelanto de aproximadamente 10 días respecto a la campaña anterior.

Por todo ello, el Servicio de Sanidad vegetal recomienda realizar un tratamiento insecticida contra esta plaga entre los días 20 y 24 de junio, ambos inclusive.



Huevos amarillos de polilla sobre bayas tintas



Huevo recién puesto, color blanco-anacarado



Mildiu


Siguen observándose síntomas de la enfermedad en cualquier órgano verde de las plantas. Ante la amenaza de nuevas precipitaciones y por la cantidad de inóculo de la enfermedad presente en el ambiente, recomendamos seguir con la protección del viñedo frente a este hongo. Se recomienda la utilización de productos “Penetrantes” o de “Fijación a las Ceras Cuticulares”.



Típica mancha de aceite sobre hoja, trampolín para nuevas contaminaciones

Oídio

Ya se han detectado bayas con síntomas de oídio. Además, continuamos dentro del período de máxima sensibilidad de la planta frente a esta enfermedad, por lo que se recomienda mantener la protección del viñedo para evitar el ataque de este hongo.



Síntomas de oídio sobre racimo

NOTA: Para la elección de las materias activas a utilizar en el control de los parásitos citados en esta información, pueden consultar el Boletín de Avisos número 8 de mayo de 2020.

Silla (Valencia), 16 de junio 2020

