



Vinya

Avís de tractament

Zona centre de València: Montroi, Real de Montroi, Montserrat, Turís, Godelleta, Cheste, Chiva, Pedralba, Casinos, Villar del Arzobispo

Cuc del raïm

Lobesia botrana

El vol de la 3a generació del cuc del raïm va començar a finals de la setmana passada sent un vol, en general, baix. A mitjans d'aquesta setmana ja es van observar les primeres postes d'aquesta generació, les quals, amb les temperatures que s'estan produint en la zona, començaran la seua eclosió previsiblement aquest cap de setmana.

D'altra banda, s'observa el típic escalonament de vol i posta d'aquesta 3a generació d'una manera molt exagerada, ja que s'observen al mateix temps en camp adults en paranys, ous en rams i larves de diferents edats, així com crisàlides de la 2a generació.

Des del Servei de Sanitat Vegetal es recomana fer un tractament insecticida contra aquesta plaga. Les dates més apropiades per a aquest tractament són des del 27 fins al 31 de juliol, tots dos inclusivament. Com a conseqüència de l'esmentat escalonament en la corba de vol i posta, i per a poder fer un bon control de la plaga, es recomana repetir el tractament passada la persistència del producte emprat, que en la pràctica vindrà a ser als 14 dies del primer tractament.

Oídio

Uncinula necator

En aquelles parcel·les en les quals s'observen símptomes d'aquesta malaltia, com a conseqüència d'una mala praxi en el seu control, es recomana fer un tractament fungicida per a detindre el desenvolupament de la malaltia.

Mosquit verd

Empoasca viti / Jacobiasca lybica

Es recomana fer un tractament insecticida contra aquesta plaga, quan se supere el llindar de tractament establert en la Gestió Integrada de Plagues el qual està establert en aquest moment fenològic en 2 insectes/fulla. En aquest cas, es podrà utilitzar un producte específic contra mosquit verd, o bé, un producte polivalent cuc del raïm-mosquit verd, en el control del cuc del raïm.



Podridura grisa

Botrytis cinerea

Es recomana fer un tractament preventiu contra aquesta malaltia per a evitar posteriors podridures en els rams com a conseqüència de les ferides del cuc del raïm, oïdi o altres paràsits de la vinya que produïsquen ferides en les baies.

Aquest tractament es podrà fer en el primer tractament del cuc del raïm, en el segon i fins i tot en els dos, però sempre es deixarà transcórrer un període de 21 dies entre l'últim tractament i la verema per a evitar possibles problemes en fermentació dels mostos.



Focus de podridura

Recomanacions

Per a un bon control d'aquests paràsits els recomanem utilitzar els volums de caldo adequats per a aconseguir un bon recobriment de tota la planta (especialment dels rams en el cas del cuc del raïm), així com la utilització de productes autoritzats i a la dosi que figure en l'etiqueta.

Productes

Al Butlletí d'Avisos número 8, juny de 2019: <https://bit.ly/2XDG5tv>

A tindre en compte

Davant els continus canvis en el Registre de Productes Fitosanitaris del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació quant a la desaparició del Registre o l'aparició de noves matèries actives autoritzades, es recomana consultar la pàgina web de l'esmentat Registre: <https://bit.ly/2DLGKUd>

Davant qualsevol dubte sobre el maneig dels plaguicides a utilitzar, contactar amb els tècnics encarregats de fer el seguiment d'aquests paràsits o amb el Servei de Sanitat Vegetal.

Silla (València), 25 de juliol de 2019



Web Sanitat Vegetal:

<http://www.agroambient.gva.es/va/web/agricultura/sanidad-vegetal>

Sanitat Vegetal en facebook:

<https://www.facebook.com/pages/category/Government-Organization/GVA-Sanitat-Vegetal-1612491505641246/>