

PARATGE NATURAL MUNICIPAL "HORT DE SORIANO-FONT DE LA PARRA"




AJUNTAMENT DE CARCAIXENT
Plaça Major, 1
46740, Carcaixent (VALENCIA)
Tel. 962457600.

ÀREA DE CONSERVACIÓ D'ESPAIS NATURALS
Conselleria de Medi Ambient,
Aigua, Urbanisme i Habitatge

Tel.: 961973578 Fax: 961973868
C/ FRANCISCO CUBELLS, 7
46011 VALENCIA



ES PREGA SILENCI



CONTROLA LA TEUA MASCOTA



RESPECTA LA FAUNA



RESPECTA LA FLORA



NO TIRES PUNTES DE CIGARRET



CAMINA PELS CAMINS I SENDES



NO TIRES FEM



PROHIBIT FER FOC
LLEVAT DE LLOCS HABITATS

DENOMINACIÓ: Paratge Natural Municipal "Font de la Parra-Hort de Soriano".
SUPERFICIE: 53,22 ha.
TERME MUNICIPAL: Carcaixent
DATA DE DECLARACIÓ: Acord del Consell de la Generalitat del 2 de febrer del 2007.
VALORS PRINCIPALS: Paisatge: Zona accidentada, amb notables pendents, que arriba als 322 metres de cota màxima.
Vegetació: Predomini de les formacions de matoll termomediterrani.
Fauna: Abundancia d'espècies d'amfibis i rèptils. Presencia de grans rapaces.
Interés Cultural: Elevat valor educacional i de escampament degut a les instalacions de l'Aula de la Natura i al àrea recreativa

El Paratge Natural Municipal "Hort de Soriano-Font de la Parra" es localitza al terme municipal de Carcaixent, a la comarca de la Ribera Alta, abarcant els últims contraforts del ramal sud de la Serralada Ibèrica i la confluència amb el Sistema Prebètic.

Els relleus calcaris de la serra s'eleven bruscament des dels plans de la ribera del Xúquer, oferint un bell fons de contrast entre les terres agrícoles del pla i la vegetació forestal de les vessants. Els punts més elevats del paratge ofereixen unes esplèndides vistes sobre les terres de les dues riberes i sobre els relleus de la veïna serra de Corbera.

La composició de la vegetació actual de la zona està condicionada, sobretot, per la incidència dels incendis forestals, que ha tingut com a conseqüència el predomini de les formacions de matoll termomediterrani amb coscoll (*Quercus coccifera*) i llentiscle (*Pistacia lentiscus*), acompanyat de formacions de labiades, dominades preferentment pel romer (*Rosmarinus officinalis*), el timó (*Thymus vulgaris*) i altres espècies. El pi blanc (*Pinus halepensis*) constitueix l'espècie arbòria predominant en l'actualitat, encara que poden trobar-se peus més dispersos de carrasca (*Quercus rotundifolia*) i fleix (*Fraxinus ornus*). Mereix destacar la presència de les següents espècies vegetals amb caràcter endèmic, com són: *Anthyllis onobrychioides*, *Antirrhinum barleri* i *litigiosum*, *Biscutella dufourii*, *Biscutella montana*, *Centaurea aspera stenophylla*, *Iberis saxatilis valentina*, *Orchis carioophora fragans* o *Verbascum fontqueri*.

Quant a la fauna citarem, en primer terme, els amfibis, amb espècies com el tòtil (*Alytes obstetricans*), el gripau corredor (*Bufo calamita*), el gripauet (*Pelodytes punctatus*), la serpeta cega (*Blanus cinereus*), la serp de ferradura (*Coluber hippocrepis*) o el fardatxo (*Lacerta lepida*). Són, no obstant això, les aus el grup faunístic millor representat. Amb presència de rapinyaires com l'àguila serpera (*Circus gallicus*), l'esperver vulgar (*Accipiter nisus*) o el duc (*Bubo bubo*). Altres espècies d'interès són el saboc (*Caprimulgus ruficollis*), l'abellerol (*Merops apiaster*), i el formiguer (*Jynx torquilla*). Finalment, respecte als mamífers, cal citar la presència d'erici comú (*Erinaceus europaeus*), la fagina (*Martes foina*), el conill (*Oryctolagus cuniculus*) o diverses espècies de rates penades.

El Paratge poseix un elevat valor educacional i d'escampament degut a les instalacions de l'Aula de la Natura "Les fonts. Illes de biodiversitat" o al àrea recreativa situada a l'Hort de Soriano. Per altra banda, la canalització d'aigua de la Font de la Parra i l'antic forn de calç, són els dos elements culturals més rellevants.

El Paratge Natural Municipal "Hort de Soriano-Font de la Parra" se encuentra localizado en el término municipal de Carcaixent, en la comarca de la Ribera Alta, abarcando las últimas estribaciones del ramal sur de la Cordillera Ibérica y la confluencia con el Sistema Prebético.

Los relieves calcáreos de la sierra se elevan bruscamente desde los llanos de la ribera del Júcar, ofreciendo un bello fondo de contraste entre las tierras agrícolas del llano y la vegetación forestal de las laderas. Los puntos más elevados del Paraje ofrecen unas espléndidas vistas sobre las tierras de las dos riberas y sobre los relieves de la vecina serra de Corbera.

La vegetación existente viene condicionada, sobre todo, por la incidencia de los incendios forestales, que, junto con otros factores de degradación, ha tenido como consecuencia el predominio de las formaciones de matorral termomediterráneo con coscoja (*Quercus coccifera*) y lentisco (*Pistacia lentiscus*), acompañado por formaciones de labiadas, dominadas preferentemente por el romero (*Rosmarinus officinalis*), el tomillo (*Thymus vulgaris*) y otras especies. El pino carrasco (*Pinus halepensis*) constituye la especie arbórea predominante en la actualidad, aunque podemos encontrar pies dispersos de carrasca (*Quercus rotundifolia*) y fresno (*Fraxinus ornus*). Merece destacarse la presencia de numerosas especies vegetales con carácter endémico, como son: *Anthyllis onobrychioides*, *Antirrhinum barleri* i *litigiosum*, *Biscutella montana*, *Centaurea aspera stenophylla*, *Iberis saxatilis valentina*, *Orchis carioophora fragans* o *Verbascum fontqueri*.

En cuanto a la fauna citaremos, en primer término, los anfibios y reptiles con especies como el sapo partero común (*Alytes obstetricans*), el sapo corredor (*Bufo calamita*) o el sapillo común (*Pelodytes punctatus*), la culebrilla ciega (*Blanus cinereus*), la culebra de herradura (*Coluber hippocrepis*) o el lagarto ocelado (*Lacerta lepida*). Son, sin embargo, las aves el grupo faunístico mejor representado, con presencia de rapaces como el águila culebrera europea (*Circus gallicus*), el gavilán común (*Accipiter nisus*) o el búho real (*Bubo bubo*). Otras especies de interés son el chotacabras cuellirrojo (*Caprimulgus ruficollis*), el abejaruco europeo (*Merops apiaster*) y el torcecuello euroasiático (*Jynx torquilla*). Por último, respecto a los mamíferos, citar la presencia de erizo europeo (*Erinaceus europaeus*), la garduña (*Martes foina*), el conejo (*Oryctolagus cuniculus*) o diversas especies de murciélagos.


El Paraje posee un elevado valor educacional y de esparcimiento debido a las instalaciones del Aula de la Naturaleza "Les fonts. Illes de biodiversitat" o al área recreativa situadas en el Hort de Soriano. Por otro lado, la canalización de agua de la Font de la Parra y el antiguo horno de cal, son los dos elementos culturales más relevantes.



Paisatge característic



Hort de Soriano



Conill



Formiguer



Gripau corredor

Fardatxo



Forn de calç